

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
1,25-dihidroxi-D3 vitamin*	d3vit	560	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	48 óra	14 nap	
12. heti szűrés kockázatelemzéssel (szabad béta-hCG, PAPP-A)	Profilból	Profil 95	géles (sárga)	szérum	1 primer cső		24 óra	24 óra	6 hónap	Magzati kockázat vizsgálatok kéréslapjának pontos kitöltése kötelező! Az első trimeszteri szűrés a terhesség 13 hét + 6.napjáig végezhető el, ezután már csak 16 hetes kockázatelemzésre van lehetőség.
17-OH-progeszteron*	17OH	67	géles (sárga)	szérum fagy. Medcover	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	2 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni. 2 db szekunder csőbe tölteni és fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
5-HIAA*	5hiaa	540	vizeletes cső	vizelet.Limbach.	1 cső					24 órás gyűjtött, savanyított vizelet szükséges hozzá. A gyűjtés ideje alatt a vizeletet fénytől elzárt, hűvös helyen kell tárolni.A gyűjtés idejét és a gyűjtött térfogatot fel kell jegyezni. A gyűjtést megelőző 3-4 napban kerülni kell: ananász, padlizsán, avokádó, banán, ribizli, sárgadinnye, ringló, egres, paradicsom, dió, szilva, koffein, kumarinok, ephedrine HCl, isoniazid, levodopa, methamphetamine, methenamine, methocarbamol, nikotin, phenobarbital, phentolamine, promethazine, streptozocin! Acetilszalicilsav és paracetamol 2 nappal a mintavétel előtt mellőzendő!
A vitamin*	avit	561	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	28 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe tölteni és fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani! Alufóliába csomagolandó, fénytől védve tárolandó!

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztatás
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Acetilkinin receptor elleni antitest	acetat	418	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
ACTH	ACTH	72	EDTA (lila)	EDTA plazma fagy.	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Mintavétel után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe tölteni, és fagyasztani. Másnap szállítani! Csak egyszer. fagyasztható!
Adiponektin*	adipo	541	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Adrenalin	adr	633	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Vérvétel előtt tanácsos kerülni a stresszes helyzeteket (mind mentális, mind fizikai). Mintavétel 30 perc nyugalom (fekvés) után ajánlott. Amennyiben megoldható, a mintavétel előtt 1 héttel javasolt abbahagyni a gyógyszeres kezelést, 3 nappal előtte pedig kerülendőek: kakaó, kávé, tea, csokoládé, diófélék, citrusfélék, vanília tartalmú termékek, nikotin. Befolyásoló gyógyszerek: nitroglicerin, alfa-metildopa, MAO-gátlók, triciklusos antidepresszánsok, L-dopa, kalcium-antagonisták, teofillin, orrcsepp, hörgőtágító, étvágycsökkentő, köhögéscsillapító. Mintavétel után azonnali centrifugálás, a plazmát 2 szekunder csőbe átönteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani.
Aktivált parciális tromboplastin idő (APTI)	apti	151	citrát (kék)	citrátos plazma		8 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hét	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztatás
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Aldoszteron*	aldosz	81	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	A vizsgálat előtt 4 héttel fel kell függeszteni a spironolacton, eplerenon, triamteren, amilorid hatóanyagú gyógyszerek, ill. drospirenon tartalmú fogamzásgátlók szedését. Ez idő alatt kerülni kell az édesgyökér és a rágódohány fogyasztását is. A mérés előtt a káliumszintet normalizálni kell, a páciens étkezzék kiegyensúlyozottan, tekintettel a sóbevitelre. A mintavétel reggel, körülbelül két órával felkelés után, ülő helyzetben, 5-15 perc pihenés után történik. Azzonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Albumin	Alb	31	géles (sárga)	szérum		1 hét	1 hónap	1 hónap		
ALEX - teljes panel -295 allergén*	Aatelj	330	géles (sárga)	szérum PrimaLab	1 primer cső		1 nap	1 hét	1 hónap	Befolyásolhatja: immunrendszer működésére ható gyógyszerek szedése: pl. szisztémás szteroid tartalmú gyógyszerek és immunszuppresszánsok, primer és szekunder immunrendszeri betegségek fennállta, diéta, hemolízis, lipémia. Nem befolyásolja az antihisztamin szedése, Nem szükséges éhgyomorrra lenni, de a zsíros ételeket kerülni kell. Külön cső szükséges!
Alfa-1 antitripszin*	a1atri	90	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	2 hónap	
Alfa-fötöproteín (AFP)	AFP	100	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	6 hónap	
Alkalikus foszfatáz	alpm	4	géles (sárga)	szérum			48 óra	7 nap		Erősen hemolizált minták kerülendő

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Allergia (egyedi)		680-753	géles (sárga)	szérum			48 óra	7 nap	1 hónap	Az ALLERGIA/TÁPLÁLÉKINTOLERANCIA VIZSGÁLATKÉRŐ LAP-on X-vel jelölni a kért egyedi allergént! Thetis-ben rögzítés esetén a mátrixon 680 és 753 között található az egyedi allergének. Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja.
Allergiapanel (rovarok)	allro	325	géles (sárga)	szérum			48 óra	7 nap	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Amiláz	Amil	9	géles (sárga)	szérum		1 hét	48 óra	1 hét		
Aminosav differenciálás* (Alanin, Alfa-aminovajsav, Arginin, Aszparagin, Aszparaginsav, Citrullin, Cisztein, Glutamin, Glutaminsav, Glicin, Hisztidin, Hidroxiprolin, Izoleucin, Leucin, Lizin, Metionin, Ornitin, Fenilalanin, Prolin, Sarkozin, Szerin, Treonin, Triptofán, Tirozin, Valin.)	amidif	575	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	7 nap	Mintavétel után, azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Antinukleáris antitest profil IgG (immunoblot) *	anabl	377	géles (sárga)	szérum Medicover	1 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	ANA profil összetétel: Jo-1 elleni antitest, SM elleni antitest, Anti-mitochondriális AMA-2 antitest, Centromer B elleni antitest, Hiszton elleni antitest, n-RNP Sm elleni antitest, Nukleoszóma elleni antitest, PCNA elleni antitest, PM-Scl elleni antitest, Riboszómális P elleni antitest, RNP 70 elleni antitest, RNP A elleni antitest, RNP C elleni antitest, Ro-52 elleni antitest, Scl-70 elleni antitest, SS-A (Ro) elleni antitest, SS-B (La) elleni antitest, dsDNS elleni antitest,
ANA (anti nukleáris antitest) ELISA*	anaeli	382	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
ANA (anti nukleáris antitest) Hep-2*	anahep	383	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
ANCA *	anca	384	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	ANCA (MPO és PR-3)

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
ANCA profil*	ancap	385	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G)
Androsztendion	Andro	69	géles (sárga)	szérum fagy.		nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	2 hónap	
Anémia perniciosza panel *	anemat	396	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Angol lelet	angol	507								Az angol nyelvű leletigényt Thetis-ben rögzíteni kell.
Annexin V IgG autoantitest*	annexG	405	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
Annexin V IgM autoantitest*	annexM	404	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
Anti C i q antitest*	antciq	398	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
Anti-CCP(anti-filaggrin)*	antccp	381	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	15 nap	6 hónap	
Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM)*	kargam	391	géles (sárga)	szérum Medicover	1 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
Anti-HBc IgM	ahbcgm	432	géles (sárga)	szérum			48 óra	7 nap	2 hónap	
Anti-Hbe antitest	ahbe	459	géles (sárga)	szérum	0,5 ml		48 óra	7 nap	2 hónap	
Anti-HBs antitest	aHBs	431	géles (sárga)	szérum			48 óra	14 nap	6 hónap	
Csomag Hepatitis B virus (HBV): HBsAg, anti-HBs, anti-HBc	Profilból	Profil 42	géles (sárga)	szérum			48 óra	14 nap	6 hónap	Csomag tartalma: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc
Anti-HBs antitest + HBsAg	Profilból	Profil 43	géles (sárga)	szérum			48 óra	15 nap	7 hónap	
Anti-Müllerian Hormon (AMH)	AMH	68	géles (sárga)	szérum		24 óra	48 óra	6 nap	2 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
anti-MuSK antitest*	amusk	419	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Anti-streptolizin O (ASO)	ASO	33	géles (sárga)	szérum		2 nap	48 óra	8 nap		
Anti-tireoglobulin (anti-TG)	aTG	55	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	6 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Anti-TPO	aTPO	53	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	6 hónap	Hemolízis és a lipémia a vizsgálatot zavarja.
Antitrombin III*	at3	157	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Anti-Xa (LMW-Heparin)*	axa	161	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	Vérvétel ideje: 3-4 óra a s.c. alkalmazás után; 3 5 nappal az i.v. beadás után." A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
APC rezisztencia*	apcrat	155	citrát (kék)	citrát plazma fagy.	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Apolipoprotein A1*	apoa1	520	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	8 nap		
Apolipoprotein A2*	apoa2	521	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	8 nap		
Apolipoprotein B*	apob	522	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	8 nap		
Aquaporin-4 elleni antitest*	aqua4	416	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 napn	6 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztatás
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
ASCA IgA*	ascaa	394	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
ASCA IgG*	ascag	395	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
Ásványi anyag profil *(magnézium, szelén, cink, króm, réz, mangán, molibdén, kadmium, nikkel)	asvp	649	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Medicover	1 cső	2 nap	2 nap	2 hét	1 hónap	Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Autoimmun bőrbetegségek antitestjei*	aborbe	397	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	Vizsgált paraméterek: Dezmoszóma, Bőr bazálmembrán elleni antitest
Autoimmun májprofil*	autmaj	426	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	Vizsgált paraméterek: AMA M2, LKM-1, SLA, Liver-citosol
B1 vitamin*	b1v	562	EDTA (lila)	EDTA telj.vér fagy Limbach	1 cső	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	EDTA-s csövet centrifugálás nélkül fagyasztani. A mintát fénytől védeni kell! Alufóliába csomagolni!
B12 vitamin	B12	87	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	24 óra	2 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
B2 vitamin*	b2v	563	EDTA (lila)	EDTA telj.vér fagy Limbach	1 cső	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	3 hónap	EDTA-s csövet centrifugálás nélkül fagyasztani. A mintát fénytől védeni kell! Alufóliába csomagolni!
B3 vitamin*	b3v	564	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	56 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
B5 vitamin*	b5v	565	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	3 hét	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
B6 vitamin*	b6v	566	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	2 hónap	Mintavétel után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Bartonella henselae antitestek (IgG, IgM)*	bartat	638	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	7 nap	1 hónap	
Béta-2-mikroglobulin*	B2MG	111	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés)	BCL	84	EDTA (lila)	EDTA plazma				8 nap	90 nap	Centrifugálás után szekunder csőbe áttölteni a plazmát.
Bone Trap 5b	bt5	637	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	4 hét	Alvadás után 30 percen belül azonnal centrifugálni, a szérumot 2 szekunder csőbe fagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Biológiailag aktív tesztoszteron	Profilból	Profil 98	géles (sárga)	szérum			48 óra	2 nap	2 hónap	
Borrelia antitestek (IgG, IgM) - reaktivitás esetén megerősítés Immunoblottal	borel	447	géles (sárga)	szérum			48 óra	6 nap	6 hónap	
C reaktív protein (CRP)	CRP	37	géles (sárga)	szérum		11 nap	48 óra	2 hónap		
C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP)	CRPU	38	géles (sárga)	szérum		11 nap	48 óra	2 hónap		
C-vitamin*	cvit	567	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	1 ml stabilizáló csőben	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	2 hét	A minta fényérzékeny! STABILIZÁLÓ CSŐ SZÜKSÉGES A VIZSGÁLATHOZ! Eszközrendelésről igényelhető! Mintavétel után az EDTA-s csövet azonnal centrifugálni, stabilizáló csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva szállítani!

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
C-peptid	Cpeptid	71	géles (sárga)	szérum fagy.	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hét	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
C1 inhibitor aktivitás*	c1akt	550	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	28 nap	A vérévételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
C1 inhibitor koncentráció*	c1kon	551	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	28 nap	A vérévételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
C3 komplement faktor	c3	410	géles (sárga)	szérum		4 óra	48 óra	8 óra	8 óra	
C4 komplement faktor	c4	411	géles (sárga)	szérum		4 óra	48 óra	8 óra	8 óra	
CA 125	CA125	102	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis és a lipémia vizsgálatot zavarja. Csak egyszer olvasható fel.
CA 15-3	CA153	103	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis és a lipémia vizsgálatot zavarja. Csak egyszer olvasható fel.
CA 19-9	CA199	104	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis és a lipémia vizsgálatot zavarja. Csak egyszer olvasható fel.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
CA 50*	ca50	558	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	3 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
CA 72-4	CA724	105	géles (sárga)	szérum			48 óra	30 nap	90 nap	
CBS 844ins68 mutáció*	cbs	655	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Medicover	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
CEA	CEA	101	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	48 óra	3 hónap	
Celluláris immun státusz*	cellim	420	Li-heparin (zöld)	Li-heparin Medicover	2 cső	6 óra				Levétel előtt egyeztetés szükséges! Mintasükséglet: 2 X 10 ml Hétfőtől csütörtökig küldhető! Szobahőn tárolandó! Tilos centrifugálni! Déli 12 óráig a laborba juttatandó!
Celluláris immun státusz és NK funkció*	cellnk	421	Li-heparin (zöld)	Li-heparin Medicover	4 cső	6 óra				Levétel előtt egyeztetés szükséges! Mintasükséglet: 4 X 10 ml Hétfőtől csütörtökig küldhető! Szobahőn tárolandó! Tilos centrifugálni! Déli 12 óráig a laborba juttatandó!
CFTR gén 36 leggyakoribb hot-spot mutáció*	cftr	488	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Chlamydia pneumoniae antitest*	chlamp	438	géles (sárga)	szérum Medicover	1 cső		48 óra	5 nap	6 hónap	
Chlamydia trachomatis antitestek*	chlamt	439	géles (sárga)	szérum Medicover	1 cső		48 óra	5 nap	6 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
CH50	ch50	645	géles (sárga)	szérum fagy. Medicover	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható		Vérvételt követően 30-60 perccel a mintát 1500-3000 g-n 5-10 percig centrifugálni. 2 szekunder csőbe áttölteni, azonnal fagyasztandó. Fagyasztva szállítandó!
Ciklosporin A*	ciklos	197	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Limbach	0,5 ml	5 nap	7 nap		4 hét	A vizsgálathoz teljes vér szükséges, centrifugálni tilos!
Cink (szeminális plazma)*	zneja	557	steril pohár	ejakulátum fagy.		30 perc			2 hónap	A vizsgálat előtt 2-5 nappal a nemi élelet fel kell függeszteni. A frissen gyűjtött spermát szobahőmérsékleten kell tartani 30 percig, majd lefagyasztani (-20 °C).
Cink (Zn)*	Zn	23	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	14 nap	1 hónap	
Cink-transzporter 8 antitest (ZnT8)	cnt8	648	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Cisztatin C*	ciszt	525	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	7 nap	7 nap	7 nap	6 hónap	
CK izoenzimek*	ckizo	529	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	28 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
CK-MB koncentráció	ckmbt	88	géles (sárga)	szérum			48 óra	2 nap		

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
ColonAiQ (kolorektális rák rizikó)*	colon	498	CELL FREE DNA STABILIZÁLÓ cső CW BIO 10 ml	Stabilizáló cső Clinomics	1 db speciális cső	96 óra			Tilos fagyasztani!	Cell free DNA stabilizáló csőbe levett minta szükséges. A csöveket teljesen meg kell tölteni, a nem teljesen megtöltött csőből a vizsgálat nem végezhető el. A csövet rögtön a vérvétel után a hossz tengely mentén 8-10-szer óvatosan meg kell forgatni, a keveredés érdekében. A vérvételi csövet TILOS CENTRIFUGÁLNI! A vérmintákat a rázkódástól és az erős fénytől védeni kell! A mintát 96 órán belül a vizsgálatot végző laborba kell szállítani! Vérvétel előtti napon és a vérvétel napján javasolt a megfelelő folyadékbevitel. A vizsgálat előtti héten vérátömlesztés nem kapható. Terhes, ill. szoptató nők esetében a vizsgálat nem végezhető el. Mintavétel előtt genetikai tanácsadás szükséges!
Cöliákia genetikai vizsgálat*	colign	485	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Cöliákia szűrés (tTgIgG,tTgIgA)*	colim	380	géles (sárga)	szérum ELISA	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
Cöroloplazmin*	Coer	41	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	14 nap	1 év	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
CT-pro-ADH (kopeptin)*	Profilból	Profil 94	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	4 hét	30 nap	A kifejezett cirkadián fluktuációk miatt párhuzamosan kell meghatározni a szérum ozmolalitását. Kávé, teát és nikotint nem szabad vérévelé előtt fogyasztani. Ha lehetséges, a gyógyszeres kezelést 48 órával korábban abba kell hagyni.
Cyfra 21-1*	Cyf211	106	géles (sárga)	szérum	0,5 ml		48 óra	4 hét	6 hónap	
Cytomegalovírus (CMV) antitestek*	CMV	440	géles (sárga)	szérum			48 óra	5 nap	6 hónap	
Csontspec. alk. foszf.(BAP)*	csap	528	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	48 óra	6 hónap	
D-dimer	Ddi	154	citrát (kék)	citrát		4 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	2 hónap	A vérévelé csöbe a vért jelig kell venni! Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Deamidált gliadin elleni antitest (IgA)	degliA	378	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Deamidált gliadin elleni antitest (IgG)	degliG	379	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
DHEA-szulfát (DHEAS)	DHEA	65	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	2 hónap	
Digoxin*	digo	186	géles (sárga)	szérum	0,5 ml	8 óra	48 óra	48 óra	3 hónap	Javasolt mintavétel a napi gyógyszeradag beszedése után 6-8 órával, vagy közvetlenül a következő adag beszedése előtt.
Dihidro-tesztoszteron*	ditesz	543	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	7 nap		
Diphtheria toxin antitest (IgG)	ditoat	642	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	7 nap	1 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatósága		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Dopamin*	dop	569	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Amennyiben megoldható, kb. 1 héttel a mintavétel előtt a gyógyszeres kezelést fel kell függeszteni (amfetaminok, étvágycsökkentők, bromokriptin, buspiron, koffein, karbidopa-levodopa, klonidin, dexametazon, vízhajtók, izoproterenol, labetalol, metildopa, MAO gátlók, nikotin, orrcseppek, propafenon, rezerpin, teofillin, triciklikus antidepresszánsok, értágítók), ill. 3 nappal előtte kerülendő a következő élelmiszerek fogyasztása: kávé, tea, banán, sajt, dió, csokoládé, tojás, alkohol. Vérvétel előtt kerülendő a stresszes helyzetek, a mintavétel 30 perces pihenő (fekvés) után javasolt. A levett mintát azonnal centrifugáljuk, majd az így nyert plazmát
Direkt bilirubin	Dbil	6	géles (sárga)	szérum		48 óra	48 óra	3 nap		Fénytől védve tartandó! Hemolízis, lipémia zavarja.
dsDNS elleni antitest*	dsdns	389	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
D-Vitamin (25-OH) totál	TDVít	78	géles (sárga)	szérum		48 óra	48 óra	7 nap	1 év	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. Nem hígítható!
E vitamin*	evit	568	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	Vérvétel éhgyomorral. A mintát alvadás után centrifugálni, és két szekunder csőbe áttölteni, fagyasztva tárolni és szállítani. Fénytől védve kell tárolni.
Echinococcus antitest	echat	641	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	7 nap	1 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
ENA panel (ELISA)*	enaeli	386	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	Összetétele: Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1
Endomízium elleni antitest (EMA) IgA/IgG*	emaiga	387	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
Endothel elleni antitest*	endoat	399	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Epesav	epesav	527	géles (sárga)	szérum			48 óra	7 nap		A mintavétel előtt 12 órás éhezés szükséges (kivéve: csecsemők, terhesek)
Epesav (széklet)*	epesz	556	széklettartály	széklet fagy. Limbach					28 nap	
Epidermális bazálmembrán elleni antitest *	epidat	406	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Epstein-Barr vírus (EBV) antitestek (IgG,VCA IgG,EBNA IgG)*	ebv	436	géles (sárga)	szérum			48 óra	2 nap	6 hónap	
Eritropoetin*	eritro	526	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	14 nap		
Faktor II*	2fak	168	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztatás
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Faktor V*	5fak	167	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérévételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Faktor VII*			citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérévételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Faktor VIII*	8fak	160	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérévételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Faktor IX*			citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétoztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Faktor XI*	11fak	166	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétoztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Faktor XIII*	13fak	162	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csöve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétoztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Fehérje azonosítása immunfixációval*	ife	415	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	1 hét	nem fagyasztható	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Fenilalanin*	fenil	576	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	7 nap	Mintavétel után, azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Ferritin	Ferr	36	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	1 év	Hemolízis a vizsgálatot zavarja. Csak egyszer olvasható fel.
Fibrinogén	Fibr	152	citrát (kék)	citrát		4 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hét	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Follikulus Stimuláló Hormon (FSH)	FSH	60	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Csak egyszer olvasható fel.
Fólsav	Fol	86	géles (sárga)	szérum			48 óra	2 nap	6 hónap	Azonnal fugálni, és hűtőbe tenni. Hemolízis a vizsgálatot zavarja
Foszfát (P)	P	20	géles (sárga)	szérum		1 nap	48 óra	4 nap		Erős hemolízis zavarja
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG)*	foszfG	428	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM)*	foszfM	429	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Foszfatidilszerin IgG autoantitest*	fosfG	400	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Foszfatidilszerin IgM autoantitest*	fosfM	401	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Fruktózamin	Frukt	40	géles (sárga)	szérum		3 nap	3 nap	2 hét	2 hónap	
Gamma GT (GGT)	GGT	3	géles (sárga)	szérum		7 nap	7 nap	7 nap		
Gangliozid autoantitest profil	gangat	646	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Gasztrin*	gastri	79	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	4 hét	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 szekunder csőbe áttölteni, és fagyasztani, fagyasztva szállítani! A vérvétel reggel éhgymorra (kb. 12 óras éhezés) történjen. Előtte 24 órával a savkezelők, H2 blokkolók, antikolinerg szerek nem vehetők be, ill. kávé nem fogyasztható.
Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest*	gad	392	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Glutation reduktáz	glure	632	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Medicover	1 cső					Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Glükóz	Glu	14	géles (sárga)	szérum		1 nap	48 óra	48 óra		Nem szeparált mintában a glükóz szint óránként 0,27-0,55 mmol/l- el csökken. Ezért azokat a mintákat, amelyt nem tudnak elválasztani (centrifugálni) fluoridos csőbe kell levenni. Erős lipémia, hemolízis zavarja.
Glükóz-plazmából	GluF	15	fluorid (szürke)	NAF 0		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (ebéd előtt)	EE	233	fluorid (szürke)	NAF EE		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (ebéd után)	EU	234	fluorid (szürke)	NAF EU		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (étkezés után)	PPvc	230	fluorid (szürke)	NAF étkezés után		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (reggeli előtt)	RE	231	fluorid (szürke)	NAF reggeli előtt		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (reggeli után)	RU	232	fluorid (szürke)	NAF reggeli után		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (vacsora előtt)	VE	235	fluorid (szürke)	NAF vacsora előtt		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz (vacsora után)	VU	236	fluorid (szürke)	NAF vacsora után		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 0'(glükózterhelés előtt)	GT0	240	fluorid (szürke)	NAF 0		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 120'(glükózterhelés után)	GT120	244	fluorid (szürke)	NAF 120		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 150'(glükózterhelés után)	GT150	245	fluorid (szürke)	NAF 150		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 180' (glükózterhelés után)	GT180	246	fluorid (szürke)	NAF 180		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 240' (glükózterhelés után)	GT240	247	fluorid (szürke)	NAF 240		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 30' (glükózterhelés után)	GT30	241	fluorid (szürke)	NAF 30		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz 60' (glükózterhelés után)	GT60	242	fluorid (szürke)	NAF 60		2 nap	7 nap	7 nap		

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Glükóz 90' (glükózterhelés után)	GT90	243	fluorid (szürke)	NAF 90		2 nap	7 nap	7 nap		
Glükóz terhelés 2 pontos	glte2	226								
Glükóz terhelés 3 pontos	glte3	227								
Glükóz terhelés 4 pontos	glte4	228								
Glükóz terhelés 5 pontos	glte5	229								
Glükóz terhelés 6 pontos	glte6	239								
GOT (ASAT)	GOT	1	géles (sárga)	szérum		4 nap	48 óra	7 nap		Hemolízis a vizsgálatot zavarja
GPT (ALAT)	GPT	2	géles (sárga)	szérum		3 nap	48 óra	7 nap		
H vitamin*	hvit	559	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		48 óra	7 nap		
Hagyományos kariotipizálás (kromozómafestés G-sávozással)*	citkar	496	9 ml Na-heparinos cső	Na-heparinos teljes vér Vascular	1 cső		24 óra			Mintavétel napján a laborba kell küldeni! Genetikai kéréslap, nyilatkozat (VASCULAR) kitöltése szükséges!
Haptoglobin*	hopto	91	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	1-2 nap	2 hónap	
Harántcsíkkolt izom elleni antitest*	harat	408	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
hCG (human korion-gonadotropin)	HCG	110	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	6 hónap	Csak egyszer olvasható fel.
HDL koleszterin	HDL	27	géles (sárga)	szérum		2 nap	48 óra	7 nap		
He-4 + CA 125 és ROMA index	Profilból	Profil 99	géles (sárga)	szérum			48 óra	2 nap	84 nap	
Helicobacter pylori elleni antitest (IgG)	Hepy	448	géles (sárga)	szérum			48 óra	3 nap	6 hónap	
Hemoglobin A1c (HbA1c)	Hba1c	134	EDTA (lila)	EDTA teljes vér			4 nap		nem tárolható	Tilos centrifugálni!
Hemokromatózis panel (HFE C282Y, HFE H63D)	hemop	656	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Medicover	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Hepatitis A vírus elleni antitestek össz. ellenanyag	aHAV	433	géles (sárga)	szérum			48 óra	48 óra	2 hónap	Felolvasztás újra fagyasztás kerülendő
Hepatitis A friss fertőzés (HAV-IgM)*	HAVIgM	863	géles (sárga)	szérum Medicover	1 cső		48 óra	48 óra	2 hónap	Felolvasztás újra fagyasztás kerülendő
Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg)	HBsAg	430	géles (sárga)	szérum			48 óra	14 nap	6 hónap	
Hepatitis B vírus e. antigén (HBeAg)	HBeAg	458	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	14 nap	6 hónap	
Hepatitis C vírus elleni antitestek	aHCV	434	géles (sárga)	szérum			48 óra	14 nap	6 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztatás
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 antitestek (IgG,IgM)*	hsv	437	géles (sárga)	szérum Medicover	1 cső		48 óra	5 nap	1 év	
Hepatitis E vírus elleni at. (IgG,IgM)*	aHEV	454	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	5 nap	2 hónap	
Hisztamin intolerancia (DAO)*	dao	535	géles (sárga)	szérum ELISA	0,5 ml		48 óra	9 nap	3 hónap	A DAO aktivitást gátolják az alkohol, illetve bizonyos gyógyszerek (acetilcisztein, ambroxol, aminofillin, amitriptilin, klorokin, klavulánsav, izoniazid, metamizol, metoklopramid, propafenon, verapamil). Javasolt kikérni a kezelőorvos véleményét, hogy a vizsgálat idejére ezek alkalmazása felfüggeszthető-e.
Hisztamin*	hisz	544	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	28 nap	Mintavétel után, azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani! Vértétel előtt kerüendő a magas hisztamintartalmú ételek fogyasztása (pl. sajt, vörösbor, savanyú káposzta)."
Hisztin elleni antitest*	hiszt	390	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	1 hónap		
HIV-1,2 antitest, HIV-1 antigén	hiv-12	435	géles (sárga)	szérum		24 óra	48 óra	8 nap	3 hónap	
HLA B27*	hlab27	493	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Medicover	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Holo-transzkobalamin*	holo	577	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztatás
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Homocisztein	homoc	39	géles (sárga)	szérum fagy.	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	2 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Húgysav	HS	13	géles (sárga)	szérum		3 nap	48 óra	7 nap		
IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest)*	IA2at	424	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	14 nap		
IgA	IgA	43	géles (sárga)	szérum		8 hónap	8 hónap	8 hónap		Erős lipémia a vizsgálatot zavarja
IgG	IgG	42	géles (sárga)	szérum		4 hónap	4 hónap	8 hónap		Erős lipémia a vizsgálatot zavarja
IgM	IgM	44	géles (sárga)	szérum		2 hónap	2 hónap	4 hónap		Erős lipémia a vizsgálatot zavarja
IgG alosztályok*	iggalo	552	géles (sárga)	szérum Limbach	4 ml		48 óra	14 nap		
Inhalatív allergiapanel (állatok)	inha	322	géles (sárga)	szérum			48 óra	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Inhalatív allergiapanel (penész és por)	inhpp	321	géles (sárga)	szérum			48 óra	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Inhalatív allergiapanel (pollenek)	inhpo	323	géles (sárga)	szérum			48 óra	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Inhalatív allergiapanel (teljes)	inhtel	324	géles (sárga)	szérum			48 óra	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Immunfixáció (paraprotein kimutatás)*	ife	415	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	1 hét	nem fagyasztható	
Inhibin B*	inhiB	545	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml				1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Interleukin-6 (IL-6)*	ileu6	548	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Interleukin-2 (IL-2) receptor *	il2r	567	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Intrinzik faktor elleni antitest*	ifact	427	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	2 hónap	
Inzulin	inz	70	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 0'(glükóz terhelés előtt)	It0	250	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 120'(glükóz terhelés után)	It120	254	géles (sárga)	szérum 120		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 150'(glükóz terhelés után)	It150	255	géles (sárga)	szérum 150		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Inzulin 180'(glükóz terhelés után)	It180	256	géles (sárga)	szérum 180		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 240'(glükóz terhelés után)	It240	257	géles (sárga)	szérum 240		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 30'(glükóz terhelés után)	It30	251	géles (sárga)	szérum 30		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 60'(glükóz terhelés után)	It60	252	géles (sárga)	szérum 60		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin 90'(glükóz terhelés után)	It90	253	géles (sárga)	szérum 90		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Inzulin elleni antitest*	inzat	403	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap	nem fagyasztható	
Inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1)*	IGF1	83	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	28 nap		
Jód*	jod	572	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		48 óra	21 nap		
K vitamin*	kvit	570	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 2 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	30 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Fénytől védeni kell! Alufóliába csomagolandó! Másnap fagyasztvá szállítani!
Kalcitonin	Kalcit	77	géles (sárga)	szérum fagy.	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	15 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztvá szállítani!
Kalcium (Ca)	Ca	19	géles (sárga)	szérum		3 nap	1 hét	1 hét	3 hónap	Azonnal centrifugálni, hogy a vvt-k ne vegyék fel a Ca-t
Kálium (K)	K	17	géles (sárga)	szérum		1 nap	1 nap	1 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Kalprotektin	kalpr	183	széklettartály	széklet			3 nap		1 hét	Széklettartályban, borsónyi mennyiség küldendő
Karbamazepin*	Carb	188	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1-2 nap	7 nap	2 hónap	A mintavétel közvetlenül az újabb gyógyszeradag bevétele előtt történjen!
Karbamid	Karb	11	géles (sárga)	szérum		7 nap	7 nap	7 nap		Icterus a vizsgálatot zavarja.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Katekolaminok vérből (adrenalin, noradrenalin, dopamin)*	kate	634	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Vérvétel előtt tanácsos kerülni a stresszes helyzeteket (mind mentális, mind fizikai). Mintavétel 30 perc nyugalom (fekvés) után ajánlott. Amennyiben megoldható, a mintavétel előtt 1 héttel javasolt abbahagyni a gyógyszeres kezelést, 3 nappal előtte pedig kerülendőek: kakaó, kávé, tea, csokoládé, diófélék, citrusfélék, vanília tartalmú termékek, nikotin. Befolyásoló gyógyszerek: nitroglicerín, alfa-metildopa, MAO-gátlók, triciklusos antidepresszánsok, L-dopa, kalcium-antagonisták, teofillin, orrcsepp, hörgőtágító, étvágycsökkentő, köhögéscsillapító. Mintavétel után azonnali centrifugálás, a plazmát 2 szekunder csőbe átönteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani.
Klorid (Cl)	Cl	18	géles (sárga)	szérum		1 nap	2 nap	2 nap	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Koenzim Q10*	koq10	571	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	3 hónap	Mintavétel után, azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Koleszterin	Kol	25	géles (sárga)	szérum			1 hét	1 hét		Icterus a vizsgálatot zavarja.
Kortizol (szérum)	Kortiz	73	géles (sárga)	szérum		8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	
Kortizol nyálból I.*	Korn1	360	speciális mintavevő	nyál	0,5 ml		10 nap	10 nap	6 hónap	A mintavétel idejét a csőre rá kell írni!
Kortizol nyálból II.*	Korn2	361	speciális mintavevő	nyál	0,5 ml		10 nap	10 nap	6 hónap	A mintavétel idejét a csőre rá kell írni!
Kortizol nyálból III.*	Korn3	362	speciális mintavevő	nyál	0,5 ml		10 nap	10 nap	6 hónap	A mintavétel idejét a csőre rá kell írni!
Kortizol nyálból IV.*	Korn4	363	speciális mintavevő	nyál	0,5 ml		10 nap	10 nap	6 hónap	A mintavétel idejét a csőre rá kell írni!
Kortizol nyálból V.*	Korn5	364	speciális mintavevő	nyál	0,5 ml		10 nap	10 nap	6 hónap	A mintavétel idejét a csőre rá kell írni!

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztatás
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Kreatin-kináz (CK)	CK	8	géles (sárga)	szérum		4 óra	12 óra	12 óra		Minél hamarabb centrifugáljuk, fénytől védjük. Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Kreatinin	Krea	12	géles (sárga)	szérum		1 hét	1 hét	1 hét		
Kromogranin A*	kroma	112	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml			4 hét	6 hónap	
Laktát-dehidrogenáz (LDH)	LDH	7	géles (sárga)	szérum		7 nap	4 nap	4 nap		Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T)*	lakint	480	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és belegeyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T)*	lakisz	481	szájnnyálkahártya-törlet	szájnnyálkahártya-törlet			24-48 óra		nem tárolható	Páciens által aláírt kéréslap és belegeyező nyilatkozat küldése kötelező!
Lamotrigin*	lamotr	198	EDTA (lila)	EDTA plazma Limbach	0,5 ml			7 nap	3 hónap	Mintavétel: közvetlenül a gyógyszer következő adagjának bevétele előtt.
LDL-koleszterin	dLDL	26	géles (sárga)	szérum		1 nap	7 nap	7 nap		
Leiden/V. faktor mutáció*	fvleid	482	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és belegeyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Legionella pneumophila antitestek (IgG, IgM)*	legiat	639	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Leptin*	Llept	546	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	200 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Lipáz	Lip	10	géles (sárga)	szérum		1 hét	3 hét	3 hét		Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Lipid prot.profil(LIPODENS)*	lipro	524	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 2 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	30 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Lipoprotein (a)*	lpa	523	géles (sárga)	szérum fagy.	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	60 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC)*	plac	631	géles (sárga)	szérum Medicover	1 ml		1 nap	1 hét	1 év	Vérvételt követően 30-60 perc elteltével a mintát centrifugálni (1500-3000 g, 5-10 perc)
Lítium*	Li	189	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 év	Az utolsó lítiumadag bevétele után 12 órával történjen a mintavétel!
Lupus antikoaguláns*	lupusz	156	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Luteinizáló Hormon (LH)	LH	61	géles (sárga)	szérum		8 óra	2 nap	2 nap	6 hónap	Csak egyszer olvasható fel.
M2-PK*	m2pksz	536	széklettartály	széklet fagy. Limbach					28 nap	
Magnézium (Mg)	Mg	21	géles (sárga)	szérum		1 hét	1 hét	1 hét		Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Makroprolaktin	Profilból	Profil 97	géles (sárga)	szérum						
Melatonin*	melato	554	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Mellékvesekéreg elleni antitest*	melat	409	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatósága		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Metanefrin	metan	635	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Vérvétel előtt tanácsos kerülni a stresszes helyzeteket (mind mentális, mind fizikai). Mintavétel 30 perc nyugalom (fekvés) után ajánlott. Amennyiben megoldható, a mintavétel előtt 1 héttel javasolt abbahagyni a gyógyszeres kezelést, 3 nappal előtte pedig kerülendőek: kakaó, kávé, tea, csokoládé, diófélék, citrusfélék, vanília tartalmú termékek, nikotin. Befolyásoló gyógyszerek: nitroglicerín, alfa-metildopa, MAO-gátlók, triciklusos antidepresszánsok, L-dopa, kalcium-antagonisták, teofillin, orrcsepp, hörgőtágító, étvágycsökkentő, köhögéscsillapító. Mintavétel után azonnali centrifugálás, a plazmát 2 szekunder csőbe fagyassza le.
Mielin oligodendrocita glikoprotein (MOG) antitest	mogat	647	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Molekuláris Alma (rMal d1, rMal d3)*	malma	591	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris Bromelain (CCD) MUX F3 IgE*	mbrom	589	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris búza IgE*	molbuz	580	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris dió IgE*	moldio	581	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris földimogyoró IgE*	mfmogy	582	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris mogyoró IgE*	mmogy	583	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris nyírfa IgE*	mnyír	588	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4)*	moszi	590	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris parlagfű IgE*	mparl	587	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris szójabab IgE*	mszoja	584	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris tehéntej IgE*	mttej	585	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Molekuláris tojásfehérje IgE*	mtojfe	586	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG)*	morb	450	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztatás
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
MTHFR mutáció* A1298C	ma1298	486	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
MTHFR mutáció* C677T	mc677t	483	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Mumps IgG *	mumps	453	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Mycoplasma pneumoniae elleni antitestek (IgG, IgM, IgA)	mpneu	446	géles (sárga)	szérum Medicover	1 cső		48 óra	5 nap	1 év	
Nátrium (Na)	Na	16	géles (sárga)	szérum		1nap	1 hét	1 hét	3 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Neuron specifikus enoláz (NSE)	NSEf	107	géles (sárga)	szérum fagy.	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Alvadás után azonnal fügálni és 2 db szekunder csőbe fagyasztani, fagyasztva szállítani! Haemolitikus minta mérésre alkalmatlan!
NK lymphocita funkció*	nklym	422	Li-heparin (Zöld)	Li-heparin Medicover	2 cső	6 óra				Levétele előtt egyeztetés szükséges! Mintaszükséglet: 2 X 10 ml Hétfőtől csütörtökig küldhető! Szobahőn tárolandó! Tilos centrifugálni! Déli 12 óráig a laborba juttatandó!
NT-ProBNP	pbnp	553	géles (sárga)	szérum			6 nap	6 nap	6 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatósága		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Noradrenalin*	nora	636	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Vérvétel előtt tanácsos kerülni a stresszes helyzeteket (mind mentális, mind fizikai). Mintavétel 30 perc nyugalom (fekvés) után ajánlott. Amennyiben megoldható, a mintavétel előtt 1 héttel javasolt abbahagyni a gyógyszeres kezelést, 3 nappal előtte pedig kerülendőek: kakaó, kávé, tea, csokoládé, diófélék, citrusfélék, vanília tartalmú termékek, nikotin. Befolyásoló gyógyszerek: nitroglicerín, alfa-metildopa, MAO-gátlók, triciklusos antidepresszánsok, L-dopa, kalcium-antagonisták, teofilin, orrcsepp, hörgőtágító, étvágycsökkentő, köhögéscsillapító. Mintavétel után azonnali centrifugálás, a plazmát 2 szekunder csőbe átönteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani.
Növekedési hormon (hGH)	HGH	74	géles (sárga)	szérum			8 óra	8 óra	2 hónap	A vérvétel előtt 30 perccel a betegnek éhomi és teljes nyugalmi állapotban kell lennie. Lipémia és a hemolízis zavarja.
Nutritív allergiapanel	nutri	326	géles (sárga)	szérum			1 hét	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Nutritív allergiapanel (húsok)	nutrh	327	géles (sárga)	szérum			1 hét	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Nutritív allergiapanel (teljes)	nuttel	328	géles (sárga)	szérum			1 hét	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Ólom*	olom	574	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Limbach	1 cső		28 nap			A vizsgálatot teljes vér szükséges, centrifugálni tilos!
Omega-zsírsav profil*	omegzs	531	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 2 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	92 nap	Mintavétel után, azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Onkoneuronális antitestek*	onkoat	417	géles (sárga)	szérum Medicover	1 ml		48 óra	14 nap	1 hónap	Összetétel: Anti-Yo, Anti-Ri, Anti-Hu, MA2/TA, CV2, Amfizizin

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Oszteokalcin	Osteo	85	EDTA (lila)	EDTA plazma			48 óra	3 nap	90 nap	Alvadás után centrifugálni, és szekunder csőbe áttölteni.
Összfehérje	TP	30	géles (sárga)	szérum		48 óra	48 óra	4 hét		
Ösztadiol (E2)	Oest	63	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	7 nap	2 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. Háromszor olvasztható fel.
Oxidált LDL*	Oldl	537	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 2 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	4 hét	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Ozmolalítás (szérum)*	sosm	539	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	7 nap		
PAI-1 gén polimorfizmus	pai1	495	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Pankreász spec.elasztáz*	pankel	532	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	28 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Pankreász spec.elasztáz*	panksz	555	széklettartály	széklet fagy. Limbach					28 nap	Hasmenéses, híg széklet nem alkalmas a vizsgálatra. A mintát fagyasztani szükséges.
Pankreász szigetsejt antitest*	pszat	393	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Parathormon (PTH)	PTH	80	EDTA (lila)	EDTA plazma		8 óra	48 óra	2 nap	6 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. 3 x olvasztható fel.
Parietális sejt elleni antitest*	pariat	396	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	2 hónap	
Parvovírus B19 antitestek (IgG,IgM)*	parvo	445	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	5 nap	1 év	
Pertussis toxin antitest (IgG)*	perat	643	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest*	peteat	425	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztatás
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Progeszteron	Prog	64	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	Csak egyszer olvasható fel. Erősen lipémiás minta zavarja.
Prokalcitonin*	Prokal	92	géles (sárga)	szérum		1 nap	48 óra	48 óra	3 hónap	
Prolaktin	Prol	62	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	2 nap	3 hónap	
Prostata panel (PSA,fPSA,proPSA,phi)	Profilból	Profil 92	géles (sárga)	szérum		3 óra	24 óra	24 óra	5 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Prostata specifikus antigén (PSA)	PSA	117	géles (sárga)	szérum		3 óra	24 óra	24 óra	5 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Protein C aktivitás*	protC	159	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Protein S aktivitás*	protS	158	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Protrombin (INR)	PT	150	citrát (kék)	citrát		8 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hét	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! Ha nem lehetséges a 8 órán belüli szállítás, akkor a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Protrombin elleni antitest*	protat	402	géles (sárga)	Szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	14 nap		

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Protrombin mutáció (II. faktor mutáció)*	protmu	484	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kérőlap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Pszedo-kolinészteráz	Che	29	géles (sárga)	szérum		4 óra	48 óra	1 hét	6 hónap	
Renin*	renin	82	EDTA 6 ml (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	A mintát a vérvétel után azonnal centrifugálja le és a plazmát 2 db szekunder csőbe fagyassza le. Tilos hűtőszekrényben tárolni! A vizsgálat előtt 4 héttel fel kell függeszteni a spironolacton, eplerenon, triamteren, amilorid hatóanyagú gyógyszerek, ill. drospirenontartalmú fogamzásgátlók szedését. Ez idő alatt kerülni kell az édesgyökér és a rágódohány fogyasztását is. A mérés előtt a káliumszintet normalizálni kell, a páciens étkezzék kiegyensúlyozottan, tekintettel a sóbevitelre. A mintavétel reggel, körülbelül 2 órával felkelés után, ülő helyzetben, 5-15 perc pihenés után történik.
Retikulocita	Reta	132	EDTA (lila)	EDTA teljes vér		48 óra			nem tárolható	Tilos centrifugálni!
Reuma faktor (RF)	RF	32	géles (sárga)	szérum		1 nap	8 nap	8 nap	3 hónap	Csak egyszer fagyasztható le.
Reverz T3*	rt3	57	géles (sárga)	szérum Budalabor	1 cső		2 nap	7 nap	2 hónap	
Réz (Cu)szérumból*	Cu	24	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		48 óra	14 nap	1 hónap	
RPR, TPHA (szifilisz szerológia)*	trp	449	géles (sárga)	szérum			48 óra	7 nap	3 hónap	
Rubeola védettség*	rubve	444	géles (sárga)	szérum Medicover	1 cső		2 nap	1 hét	1 év	
Rubeola vírus antitestek (IgG, IgM)*	RUB	443	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	48 óra	3 hónap	
S 100 protein*	S100	108	géles (sárga)	szérum		8 óra	2 nap	2 nap	3 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
SARS-CoV-2 IgG (1st IS) antitest*	covat2	500	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml	8 óra	14 óra	14 nap	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
SCC*	scc	538	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
sFLT1/PLGF arány	sflt	533	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani! Terhességi hetet kérjük megadni!
SHBG	SHBG	66	géles (sárga)	szérum		8 óra	48 óra	7 nap	2 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zav. arja. 2 X olvasható fel.
Spermium elleni antitest*	speat	407	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Szabad és biológiaiailag aktív tesztoszteron	Profilból	Profil 98	géles (sárga)	szérum			2 nap	2 nap	2 hónap	Összetétel: totál tesztoszteron, SHBG, albumin
szabad protein S antigén*	fprotS	165	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétoztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
szabad PSA (fPSA)	FPSA	118	géles (sárga)	szérum		3 óra	1 nap	1 nap	5 hónap	Hemolízis a vizsgálatot zavarja.
Szabad T3 (fT3)	FT3	52	géles (sárga)	szérum		8 óra	2 nap	2 nap	2 hónap	3 x felolvasható és visszafagyasztható
Szabad T4 (fT4)	FT4	51	géles (sárga)	szérum		8 óra	2 nap	2 nap	2 hónap	Csak egyszer olvasható fel.
Székklet vér (immuno)	Szvér1	180	széklettartály	széklet		18 nap	3 hónap		1 év	Székklettartályban, borsónyi mennyiség küldendő
Székklet vér 2 (immuno)	Szvér2	181	széklettartály	széklet		18 nap	3 hónap		1 év	Székklettartályban, borsónyi mennyiség küldendő
Székklet vér 3 (immuno)	Szvér3	182	széklettartály	széklet		18 nap	3 hónap		1 év	Székklettartályban, borsónyi mennyiség küldendő
Szelén*	sze	573	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		48 óra	28 nap		

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Szelén*	szeltv	578	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Limbach	1 cső		4 hét			A vizsgálathoz teljes vér szükséges, centrifugálni tilos!
Szerotonin*	szerot	547	EDTA (lila)	EDTA plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	90 nap	Mintavétel után 30 perccel centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Fagyasztva szállítani! A következő hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek szedését 3 nappal a vérvétel előtt fel kell függeszteni: klórpromazin, meprednizol- karbamát, metokarbamol, paracetamol és acetilszalacilsav. Kerülni kell a következő ételeket: ananász, padlizsán, avokádó, banán, ribizli, dinnye, szilva, egres, paradicsom, dió, szilva
Szérum Amiloid A (SAA)*	saa	534	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	8 nap	3 hónap	
Szérum elektroforézis (ELFO)*	FehELFO	414	géles (sárga)	szérum Medicover	0,5 ml		48 óra	1 hét	nem fagyasztható	
Szérum ozmolalítás*	ozmol	539	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	1 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Szolubilis transferrin receptor	szoltr	530	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	8 óra	48 óra	7 nap	3 hónap	
Szöveti polipeptid antigén (TPA)*	TPA	109	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	6 hónap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Szövet specifikus autoantitestek*	szeat	388	géles (sárga)	szérum Medicover	1 ml		48 óra	14 nap		Összetétel: mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulín elleni antitestek
Szteroid-17-alfa-hidroxiláz antitest	sz17at	375	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Szteroid-21-hidroxiláz antitest	sz21at	376	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml	24 óra	48 óra	14 nap	1 hónap	
Szuperoxid dizmutáz	szupdi	651	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Medicover	1 cső					Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Táplálékintolerancia (IgG) panel (220+)*	tig221	332	géles (sárga)	szérum Budalabor	1 cső		2 nap	2 nap	1 hónap	
Táplálékintolerancia (IgG) panel (108 tápanyag)*	int108	331	géles (sárga)	Szérum Medicover	1 cső	1 nap	1 nap	14 nap		
Táplálékintolerancia (IgG) panel (46)	food46	330	géles (sárga)	szérum			2 nap	2 nap	7 nap	
Teljes vizelet (általános és üledék)	Tviz	200	vizeletes cső	vizelet						
Tetanus antitoxin (IgG)	tetat	644	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
TH1-TH2 citokin dominancia*	th1th2	423	Li-heparin (zöld)	Li-heparin Medicover	2 cső	6 óra				Levétel előtt egyeztetés szükséges! Mintaszükséglet: 2 X 10 ml Hétfőtől csütörtökig küldhető! Szobahőn tárolandó! Tilos centrifugálni! Déli 12 óráig a laborba juttatandó!
Tireoglobulin	TRG	54	géles (sárga)	szérum		8 óra	2 nap	2 nap	2 hónap	Csak egyszer olvasható fel
TNF-alfa*	tnfa	412	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 0,5 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	365 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Totál bilirubin	Tbil	5	géles (sárga)	szérum		1 nap	48 óra	7 nap		Fénytől védve tartandó! Heamolizis kerülendő
Total IgE	TotIgE	320	géles (sárga)	szérum			2 nap		6 hónap	
Totál tesztoszteron	Tesz	75	géles (sárga)	szérum		8 óra	2 nap	2 nap	2 hónap	
Toxoplasma gondii elleni antitestek (IgG,IgM)	TOXO	441	géles (sárga)	szérum			48 óra	5 nap	2 hónap	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Toxikus fémek profilja vérből*	toxp	650	6 ml EDTA (lila)	EDTA teljes vér Medicover	1 cső	2 nap	2 nap	2 hét	1 hónap	(aluminium, arzén, berillium, bizmut, ólom, kadmium, króm, kobalt, réz, nikkel, palládium, higany, ezüst, tallium, ón). Külön cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Toxocara	toxcar	452	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	14 nap		
Transzferrin	Trf	34	géles (sárga)	szérum		1 nap	48 óra	1 hét	3 hónap	
Trigliceridek	Tg	28	géles (sárga)	szérum		1 nap	48 óra	7 hét	3 hónap	Erősen lipémiás minták kerülendők
Triptáz*	tripta	413	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	2 x 1 ml	nem tárolható	nem tárolható	nem tárolható	14 nap	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Trombin idő	thrido	153	citrát (kék)	citrát		4 óra	Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hét	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! Ha nem lehetséges a 4 órán belüli szállítás, akkor a csövet le kell lecentrifugálni, a plazma felső 3/4-ed részét leszívni és -20 oC-ra lefagyasztani. Fagyasztva szállítani!
Trombocita citráts vérből	citplt	135	citrát (kék)	citrát		8 óra				
Trombózis mutáció panel (3)* (FV Leiden, protrombin gén, MTHFR 677T)	tropcr	492	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Trombózis mutáció panel (4)* (FV Leiden, protrombin gén mutáció, MTHFR A1298C gén mutáció, MTHFR gén mutáció 677 T)	tromut	453	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Trombózis mutáció panel (5)* (FV Leiden, protrombin gén mutáció, MTHFR A1298C gén mutáció, MTHFR gén mutáció 677 T, PAI-I gén polimorfizmus)	tropai	497	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Troponin-I (hs-cTnI)	cTnI	89	géles (sárga)	szérum		4 óra	2 nap	2 nap	1 hónap	
TSH	TSH	50	géles (sárga)	szérum		18 óra	48 óra	6 nap	3 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja. Csak kétszer fagyasztható.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
TSH receptor elleni AT (TRAK)	TRAK	56	géles (sárga)	szérum			1-2 nap	1-2 nap	2 hónap	
Valproinsav*	valp	187	géles (sárga)	szérum Limbach	1 ml		1-2 nap	7 nap	1 hónap	
Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG)*	vzigg	442	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	5 nap	2 hónap	Hemolízis, icterus és a lipémia vizsgálatot zavarja.
Varicella-zoster vírus elleni antitest (IgG, IgM)*	vzgm	451	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		48 óra	5 nap	2 hónap	Hemolízis, icterus és a lipémia vizsgálatot zavarja.
Vas (Fe)	Fe	22	géles (sárga)	szérum		7 nap	48 óra	3 hét		Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Vegyes Allergia panell	vegyall	329	géles (sárga)	szérum			48 óra	1 hét	1 hónap	Hemolízis, lipémia a vizsgálatot zavarja
Vércsoport és ellenanyagszűrés*	VCSOPS	137	EDTA 6 ml (lila)	EDTA 6 ml			3 nap		nem tárolható	A vércsoport vizsgálatot kérjük külön sorszámmal rögzíteni (kivéve csomagoknál!) Kérőlap kitöltése szükséges. Thetis felhasználók esetében lehetőség van a vércsoportra vonatkozó paraméterlista kérdéseit kitölteni a kérőlap helyett. A mintavételi csövön két betegazonosító szerepeljen az etikettcímke alatt. A vizsgálatra haemolitikus és alvadékos minta nem megfelelő!
Vérkép	VK5	130	EDTA (lila)	EDTA teljes vér		8 óra			nem tárolható	Csak aznap mérhető! centrifugálni! Tilos
Vesekő-analízis	veseko	192	vizeletes cső	egyéb						
Vizelet amiláz	Vami	272	vizelet	vizelet		2 nap	10 nap	10 nap		
Vizelet fehérje	VFeh	271	vizelet	vizelet			1 hónap	1 hónap	nem tárolható	
Vizelet fehérje (gyűjtött vizeletből)	GyFeh	291	vizelet	gyűjtött vizelet			2 nap	2 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztatás
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Vizelet foszfát	VP	277	vizelet	vizelet			2 nap	2 nap		
Vizelet foszfát (gyűjtött vizeletből)	GyP	296	vizelet	gyűjtött vizelet			2 nap	2 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet glükóz	VG	273	vizelet	vizelet		nem tárolható	Analizálni, amint lehetséges	Analizálni, amint lehetséges		
Vizelet glükóz (gyűjtött vizeletből)	GyG	292	vizelet	gyűjtött vizelet		nem tárolható	Analizálni, amint lehetséges	Analizálni, amint lehetséges		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet húgysav	VHs	276	vizelet	vizelet		4 nap	nem tárolható	nem tárolható		
Vizelet húgysav (gyűjtött vizeletből)	GyHs	295	vizelet	gyűjtött vizelet		4 nap	nem tárolható	nem tárolható		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet kalcium	VCa	275	vizelet	vizelet		2 nap	4 nap	4 nap		
Vizelet kalcium (gyűjtött vizeletből)	GyCa	294	vizelet	gyűjtött vizelet						24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet kálium	VK	281	vizelet	vizelet		45 nap	2 hónap	2 hónap		

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Vizelet kálium (gyűjtött vizeletből)	GyK	301	vizelet	gyűjtött vizelet		45 nap	2 hónap	2 hónap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet karbamid	VKar	278	vizelet	vizelet		2 nap	7 nap	7 nap		
Vizelet karbamid (gyűjtött vizeletből)	GyKar	298	vizelet	gyűjtött vizelet		2 nap	7 nap	7 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet klorid	VCl	282	vizelet	vizelet		1 hét	1 hét	1 hét		
Vizelet klorid (gyűjtött vizeletből)	GyCl	302	vizelet	gyűjtött vizelet		1hét	1 hét	1 hét		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet kreatinin	VKr	274	vizelet	vizelet			7 nap	7 nap		
Vizelet kreatinin (gyűjtött vizeletből)	GKrp	293	vizelet	gyűjtött vizelet			7 nap	7 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet magnézium (gyűjtött vizeletből)	GyMg	298	vizelet	gyűjtött vizelet			7 nap	7 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtésvégén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet mikroalbumin	MAU	270	vizelet	vizelet			1 hónap	1 hónap	nem ajánlott	

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Vizelet mikroalbumin (gyűjtött vizeletből)	GyMAU	290	vizelet	gyűjtött vizelet			1 hónap	1 hónap	nem ajánlott	24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet nátrium	VNa	280	vizelet	vizelet		45 nap	45 nap	45 nap		
Vizelet nátrium (gyűjtött vizeletből)	GyNa	300	vizelet	gyűjtött vizelet		45 nap	45 nap	45 nap		24 órás gyűjtés javasolt tartósítószer nélkül. A gyűjtés alatt a vizelet hűtőben tárolandó. Gyűjtés végén a mintát alaposan össze kell keverni. A teljes mennyiséget pontosan feljegyezni, és 10 m-tl a laboratóriumba juttatni.
Vizelet porfirin frakciók	vizpor	653	vizeletes cső	24 órás gyűjtött vizelet						24h gyűjtött vizelet, a gyűjtés alatt hűtve tárolni a mintát. Minnél hamarabb a laboratóriumba juttatni. Vizelet mennyiségét meg kell adni.
Vizelet porfobilinogén	vizpbi	654	vizeletes cső	24 órás gyűjtött vizelet						24h gyűjtött vizelet, a gyűjtés alatt hűtve tárolni a mintát. Minnél hamarabb a laboratóriumba juttatni. Vizelet mennyiségét meg kell adni.
Vizelet réz ürítés	vizrez	652	vizeletes cső	24 órás gyűjtött vizelet						24h gyűjtött vizelet, a gyűjtés alatt hűtve tárolni a mintát. Minnél hamarabb a laboratóriumba juttatni. Vizelet mennyiségét meg kell adni.
VLCFA (hosszú szénláncú zsírsavak: C22-26)	vlcfa	630	EDTA (lila)	EDTA plazma Limbach	2 ml					Éhgyomri mintavétel szükséges.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
von Willebrand faktor antigén (vWF Ag)*	wilfak	163	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
von Willebrand faktor multimer analízis*	wilfma	164	citrát (kék)	citrát plazma fagy. Limbach	2 x 1 ml		Tilos 4-8° C-on tárolni!	Tilos 4-8° C-on tárolni!	1 hónap	A vérvételi csőbe a vért jelig kell venni! A csőve(ke)t 2x kell lecentrifugálni, a "Speciális alvadási vizsgálatok tájékoztatója" szerint, két szekunder csőbe szétosztani, és -20°C-ra lefagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Vörösvérsejt süllyedés	Wedta	131	EDTA (lila)	EDTA teljes vér		12 óra			nem tárolható	Csak aznap mérhető! Tilos centrifugálni!
Yersinia antitestek (IgA, IgG)*	yersat	640	géles (sárga)	szérum Limbach	0,5 ml		1 nap	7 nap	1 hónap	
Y-kromoszóma mikrodéláció * (Y-kromoszóma AZFa, AZFb és AZFc régióinak vizsgálata)	ykrom	487	EDTA (lila)	EDTA teljes vér Vascular	1 cső		4 nap		1 hónap	Páciens által aláírt genetikai kéréslap és beleegyező nyilatkozat küldése kötelező! Külön EDTA-s cső szükséges! Tilos centrifugálni!
Zonulin (széklet)*	zonu	549	széklettartály	széklet fagy. Limbach					28 nap	
Zonulin*	zonuse	529	géles (sárga)	szérum fagy. Limbach	1 ml	1 óra		24 óra	8 hét	Alvadás után azonnal centrifugálni, 2 db szekunder csőbe áttölteni, fagyasztani. Másnap fagyasztva szállítani!
Mikrobiológia										

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat	bstrep	Mikro 43	Transwab			48-72 óra				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Tenyésztésre minta hétfőtől péntekig küldhető!
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob)	anaero	Mikro 2	Transwab	mély sebváladék, genny, punktátum		48-72 óra				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Tenyésztésre minta hétfőtől péntekig küldhető!
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob)	anaero	Mikro 2	Steril pohár Fecskendő	punktátum		24 óra				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Tenyésztésre minta hétfőtől péntekig küldhető!
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba)	aerob	mikro 1	Transwab	orrváladék torokváladék fülváladék kötőhártya-váladék sebváladék (felszíni) húgycsőváladék hüvelyváladék cervikálisváladék genny		48-72 óra				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Tenyésztésre minta hétfőtől péntekig küldhető!
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba)	aerob	Mikro 1	Boricon	vizelet		2 óra	24 óra			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Tenyésztésre minta hétfőtől péntekig küldhető!
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba)	aerob	Mikro 1	Steril pohár	köpet ejakulátum punktátum		2 óra	24 óra			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Tenyésztésre minta hétfőtől péntekig küldhető!
Calicivírus/Norovírus antigén kimutatása székletből	szcali	Mikro 23	Széklettartály	széklet			2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből	szclos	Mikro 22	Székklettartály	széklet			2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni.
Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal	fereg	Mikro 25	Székklettartály	széklet			2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni.
Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből	szheli	Mikro 41	Székklettartály	széklet			2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni.
Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső)	kenert	Mikro 48	Tárgylemez	hüvelyváladék húgycsőváladék		korlátlan				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni.
Körömkaparék sarjadzó és fonalas gombák tenyésztése	koromk	Mikro 46	vizeletes cső	egyéb						A levett körömkaparékokat átlátszó műanyag csőbe (vizeletes cső) helyezni, és páciens adatokkal ellátni!
Legionella antigén kimutatása vizeletmintából	vlegio	Mikro 48	Sterilpohár	vizelet		2 óra	24 óra			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni.
MACI (Multirezisztens Acinetobacter baumannii) szűrés	maci	Mikro 65	Mintatípusnak megfelelő mintavevő	orr-torok, köpet, húgycső, genitális váladék, széklet,		48 óra				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Tenyésztésre minta hétfőtől péntekig küldhető!
MRSA szűrővizsgálat (orr, torok)	MRSA	Mikro 42	Transwab	orrváladék, torokváladék		48-72 óra				MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Tenyésztésre minta hétfőtől péntekig küldhető!
Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp. tenyésztés	mycopt	Mikro 7	Speciális mintavevő: R1 transzport fiola	genitális váladék		5 óra	48 óra			A nemi váladékokat tamponnal kell levenni és a tampont közvetlenül a rendelkezésre bocsátott R1 transzport fiolába kell alaposan belemosni.
Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp. tenyésztés	mycopt	Mikro 7	Steril vizeletes pohár	elsőszugaras vizelet (csak férfiaknál)		24 óra				Vizelet esetén az elsőszugar vizeletet steril vizeletes pohárba kell venni és +4C-on tárolva maximum 24 órán belül a laborba kell juttatni.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	
Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból rezisztenciával	neiss	Mikro 45	Transwab	genitális váladék		24 óra	Tilos hűtve tárolni!	Tilos hűtve tárolni!		Tilos hűteni! Minnél előbb a mikrobiológiai laborba juttatni! MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Csak hétfőtől péntekig küldhető!
Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium)	protoz	mikro 24	Széklettartály	széklet			2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni.
Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből	szrota	Mikro 21	Széklettartály	széklet			2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni.
Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia nélkül	sargom	Mikro 47	Mintatípustól függően: Transwab, steril pohár, Boricon	minta gomba tenyésztésre			2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Minta csak hétfőtől péntekig küldhető!
Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből	vstrep	Mikro 45	sterilpohár	vizelet		2 óra	24 óra			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Minta csak hétfőtől péntekig küldhető!
Széklet munkaalkalmassági vizsgálata	szmunk	Mikro 40	Széklettartály	széklet			2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Tenyésztésre minta hétfőtől péntekig küldhető!
Széklettenyésztés bakteriológiai tenyésztése (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli)	szteny	Mikro 20	Széklettartály	széklet			2-3 nap			MIKRO sorszámtartományra rögzíteni vagy mikrobiológiai kériólapot tölteni. Tenyésztésre minta hétfőtől péntekig küldhető!

A * jelzett vizsgálatokat közreműködő labor végzi.

A zöld mezők tartalmazzák a németországi vizsgálatokat.

A késsel jelzett cellák fagyasztott mintát igényelnek!

A sárgával jelöltek új vizsgálatok vagy változás történt bennük!

A piros szín kivezetett vizsgálatot jelöl.

Teszt neve	Thetis azonosító	Thetis kód	Mintavevő	Mintatípus	Minta mennyiség	Primer cső eltarthatósága (vér esetében centrifugálás után)		Szekunder cső eltarthatóság		Mintaelőkészítés/tájékoztató
						szobahőn	4-8° C	4-8° C	-20°C	

Kiadás dátuma: 2025. 05. 07.